

Overzicht indicaties laboratoriumbepalingen bij CVRM-patiënten					
	Risico-inventarisatie	Aanvullend onderzoek	Na start diuretica / ACE / ARB	Na start statine	Follow up, Stabiele fase
Nuchtere Glucose	eenmalig	op indicatie 2 ^e meting			eens per 3-5 jaar
TC/HDL ratio	eenmalig				
LDL	eenmalig			3 maandelijks tot stabiel	facultatief jaarlijks
Triglyceriden	eenmalig				op indicatie
Creatinine ** (bepaling eGFR)	eenmalig		zie *		jaarlijks bij diuretica, ACE, ARB
Albumine / Creatinine ratio** (in urine)		bij verminderde eGFR			jaarlijks bij gebruik antihypertensiva en nierfunctiedaling**
Kalium		Voor start antihypertensiva			jaarlijks bij diuretica, ACE ARB

Let op: bij start en aanpassen statinebehandeling controle-effect uitsluitend op LDL

* 10-14 dagen na start en na elke aanpassing, daarna 3 en 6 maanden, dan jaarlijks follow-up

** volg de NHG standaard Chronische nierschade (M109) om op basis van de eGFR en de mate van albuminurie vast te stellen of er sprake is van nierschade.