

INDICATOREN KETENZORG FRIESLAND 2014

COPD

1	% COPD patiënten in de (praktijk)populatie.	4.635	2,1%
2	% COPD patiënten in de praktijkpopulatie dat in de eerste lijn worden behandeld in het afgelopen jaar.	2.220	47,9%
2.1	Aantal patiënten meegenomen in rapport (actief in gehele rapportperiode)	1.421	64,0%
3	% COPD patiënten waarbij inhalatietechniek is gecontroleerd in de afgelopen 12 maanden.	723	50,9%
4	% COPD patiënten waarbij spirometrie (FEV1/FVC ratio post BD) gedaan is in de afgelopen 12 maanden.	813	57,2%
5	% COPD patiënten waarbij het functioneren van de patiënt volgens een gestructureerde methode is vastgelegd in de afgelopen 12 maanden (volgens CCQ of RIQ-MON10 of MRC).	968	68,1%
6	% COPD patiënten waarbij de mate van bewegen is gecontroleerd in de voorafgaande 12 maanden.	1.012	71,2%
7	% COPD patiënten waarvan de rookstatus is vastgelegd.	1.072	75,4%
8	% COPD patiënten dat in de afgelopen 12 maanden een influenzavaccinatie heeft gekregen.	400	28,1%
10	% COPD patiënten bij wie de BMI is berekend in het afgelopen jaar.	1.070	75,3%
11	% COPD patiënten die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is.	382	35,6%
12	% COPD patiënten waarbij zich in de afgelopen 12 maanden 2 of meer (nieuwe) exacerbaties hebben voorgedaan.	57	4,0%
13	% COPD patiënten binnen de praktijk die in behandeling zijn binnen de 2e lijn.	2.415	52,1%
14	% COPD patiënten binnen de praktijk die toegang hebben tot het zelfmanagement portaal.	-	0,0%
15	% COPD patiënten in behandeling binnen de zorggroep waarvoor een individueel zorgplan is opgesteld.	617	43,4%
	Praktijkpopulatie	221.165	