

VVR (patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie)

Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2018

BM nr.	Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1		Prevalentie VVR
2		Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist
3		% patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)
4	1	% VVR patiënten in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode
5	2	% VVR patiënten in zorgprogramma < 70 jr. bij wie de bloeddruk is gemeten met systolische bloeddruk lager dan of gelijk aan 140 mm Hg
7	3	% VVR patiënten in zorgprogramma jonger dan 80 jr. bij wie LDL is bepaald met LDL-cholesterolwaarde lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l
8	4	% VVR patiënten in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd
9	5	% VVR patiënten in zorgprogramma dat rookt
12	6	% VVR patiënten in zorgprogramma bij wie eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar
14	7	% VVR patiënten in zorgprogramma bij wie mate van beweging is vastgelegd in de afgelopen 12 maanden